

馬詰眼科

〒197-0023 東京都福生市志茂224-1

TEL.042-553-9521

診療時間

【午前】 9:00 ~ 12:30 (受付は 8:30 から)

【午後】 14:30 ~ 17:30 (受付は 13:00 から)

※木曜午前のみ完全予約制。

予約方法は受付または電話にて。

受付時間は 8:30 ~ 12:00 まで

	月	火	水	木	金	土	日
午前 (AM)	●	●	●	完全 予約制	●	●	休診
午後 (PM)	●	●	●	休診	●	休診	休診

休診日

【休診日】 日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

白内障手術を 受ける方へ

No.

氏名

殿



手術までの予定

項目	内容	持ち物	家族の付添
説明会 手術予約 採血 検査予約	<ul style="list-style-type: none"> ●手術説明 ●手術日の予約 ●手術申込書提出 ●血液検査 ●検査日時予約 	●パンフレット	
検査 1 回目	<ul style="list-style-type: none"> ●散瞳検査 (運転禁止) ●内科医師への紹介 ●内服中の薬の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ●パンフレット ●予約票 ●お薬手帳 ●使用中の目薬 	
紹介状を持って内科へ行く		<ul style="list-style-type: none"> ●紹介状 ●保険証 	
検査 2 回目	<ul style="list-style-type: none"> ●散瞳検査 (運転禁止) ●内科医師の返事確認 ●手術当日の説明 ●手術前の目薬の処方 	<ul style="list-style-type: none"> ●パンフレット ●予約票 ●内科の返事 	必要

手術

項目	内容	持ち物	家族の付添
術眼	●散瞳検査 (運転禁止)	<ul style="list-style-type: none"> ●手術同意書 ●手術費用 ●目薬 (袋ごと) ●パンフレット ●予約票 	必要

翌日診察

項目	内容	持ち物	家族の付添
術眼	<ul style="list-style-type: none"> ●散瞳検査 (運転禁止) ●手術後の説明 ●手術後の目薬の処方 	●パンフレット	必要

手術後の通院

火曜 手術 (午前中) → 水曜 診察 8 時 45 分 → 金曜 診察
 水曜 手術 (午前中) → 木曜 診察 8 時 45 分 → 土曜 診察
 金曜 手術 (午前中) → 土曜 診察 8 時 45 分 → 火曜 診察

眼内レンズとは

1. 物が実物大に見え、小さく見えたりゆがんだりせず、ほぼ一生入れたままで出し入れすることはありません。
取り除いた水晶体の代わりに、ピント合わせを行います。
2. 遠く、または近くにピントを合わせ眼内レンズを選びます。

レンズのピント合わせ

手術の時、眼内レンズを移植します。

<p>遠くにピントを合わせた場合</p>	<p>裸眼でテレビを見たり、運転などの距離</p> 	<p>近くの物を見るときに、近用メガネが必要になる事がある</p>
<p>近くにピントを合わせた場合</p>	<p>裸眼で読書、縫いものなどをする、手元の距離</p> 	<p>遠くの物を見るときに、遠用メガネが必要になる事がある</p>

<p>両眼手術の方</p>		<p>ピントをどちらの距離に合わせるかご検討下さい。</p>
<p>片眼手術の方</p>		<p>手術をしない方の眼とのバランスを考え、医師が決定します。</p>

※レンズの度は予測通りにならない事があります。その際は、メガネで調整する事があります。
※ただし、どちらにピントを合わせても乱視の強い方は、乱視の度が入ったメガネが必要となる事があります。

メガネを作る時期


手術後、視力が安定する**1ヶ月後位が目安**です。
メガネの検査をし処方箋を作成後、それを持ってメガネ店へ行ってください。

眼内レンズの種類

眼内レンズは大きく分けて、単焦点レンズと多焦点レンズがあります。
眼内レンズは人の水晶体と違い、ピントを調整する機能はありません。


単焦点眼内レンズ

ピントが合う距離が1つなので、患者さんをご自分の生活スタイルに合わせて、両眼手術の方のみ、遠くか近くか、どちらのピントに合わせるかを選んでいただきます。選んだピント以外の距離はピントが合わないため、その距離を見るにはメガネが必要になります。



多焦点眼内レンズ


多焦点眼内レンズは、光の性質を利用して、遠く、中間、近くの3か所に焦点を結ぶことができる眼の中に入れるレンズです。
メガネを必要とする頻度をかなり減らすことができます。




多焦点レンズを選択する場合の注意事項

- 多焦点眼内レンズを使用した白内障手術では、術後、メガネの使用頻度を減少させることが期待されますが、見え方に応じてメガネによる矯正が必要になることがあります。
- 手術後の見え方は、単焦点眼内レンズに比べてコントラストがやや低下します。また、夜間に光が拡散するなどの症状を自覚することがあります。
- 多焦点眼内レンズの機能を脳が順応し、視力が安定するまでに1ヶ月から3ヶ月を要します。

手術開始までの流れと、手術時の注意



手術後の流れ



※手術室では医師・看護師の指示に従って下さい。